

# รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

## ไตรมาสที่ 2 ปี 2560

| ลำดับ | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย   | Quick win<br>ไตรมาส 2  | ผลการ<br>ดำเนินงาน                                  |
|-------|---|--|--|---|
| 1.    | อัตราผู้ป่วยความดันโลหิตสูงและ/หรือเบาหวานรายใหม่           | 1. ลดจำนวนผู้ป่วย HT รายใหม่ ร้อยละ 2.5 จากปี 2559<br>2. ลดจำนวนผู้ป่วย DM รายใหม่ ร้อยละ 5.0 จากปี 2559 | DM<br>ปี 59 = 1,602 ราย<br>ปี 60 = 1,525 ราย<br>HT<br>ปี 59 = 3,910 ราย<br>ปี 60 = 4,106 ราย | DM<br>ลดลงร้อยละ 4.80<br>HT<br>เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.01 |
| 2.    | ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมได้ | DM $\geq$ ร้อยละ 40<br>HT $\geq$ ร้อยละ 50   |  | DM<br>ร้อยละ 15.52<br>HT<br>ร้อยละ 22.97            |

## รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

| ลำดับ | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย                        | Quick win<br>ไตรมาส 2    | ผลการ<br>ดำเนินงาน             |
|-------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 3.    | ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง<br>ที่ขึ้นทะเบียน ได้รับการประเมิน<br>โอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ<br>หลอดเลือด (CVD Risk) | ≥ ร้อยละ 80                     | ร้อยละ 20                | ร้อยละ 59.81                   |
| 4.    | อัตราการตายของผู้ป่วยโรคหลอดเลือด<br>สมอง  | ≥ ร้อยละ 7                      |                          | ร้อยละ 15.61                   |
| 5.    | อัตราการตายจากโรคหลอดเลือด<br>หัวใจ  | ไม่เกิน 28 ต่อแสน<br>ประชากร    |                          | ร้อยละ 13.76 ต่อ<br>แสนประชากร |
| 6.    | อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จ  | ไม่เกิน 6.3 ต่อ<br>ประชากรแสนคน | ฆ่าตัวตายสำเร็จ<br>10 คน | อัตรา 2.70 ต่อแสน<br>ประชากร   |

## รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

| ลำดับ | ตัวชี้วัด  | เป้าหมาย   | Quick win ไตรมาส 2   | ผลการดำเนินงาน             |
|-------|--|--|--|----------------------------|
| 7.    | ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m <sup>2</sup> /yr | อัตราการลดลงของ eGFR < 4 ml/min/1.73m <sup>2</sup> /yr ≥ ร้อยละ 65                 |  | ร้อยละ 72.94               |
| 8.    | อัตราตายจากโรคมะเร็งตับ  | - ลดลง ร้อยละ 5 ภายใน 5 ปี (วัดผลในปี 2564)<br>- ปี 2560 ลดลง 23.5 ต่อประชากรแสนคน | เป้าหมาย คัดกรอง CCA ด้วย U/S 3,000 คน ผลงาน 2,803 คน คิดเป็น ร้อยละ 93.43 | อัตราตาย 0 ต่อแสนประชากร   |
| 9.    | อัตราการเกิดการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)              | ไม่เกิน 130 ครั้ง/แสนประชากร   |  | ร้อยละ 152.47 / แสนประชากร |

# รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

| ลำดับ | ตัวชี้วัด   | เป้าหมาย   | Quick win<br>ไตรมาส 2                          | ผลการ<br>ดำเนินงาน |
|-------|---|--|--|--------------------|
| 10.   | โรงพยาบาลที่มีการดูแลแบบ<br>ประคับประคอง (Palliative Care)                                  | ร้อยละ 100<br>ตามขั้นตอนที่<br>กำหนดในวิธีการ<br>ประเมินผล | ระดับ S = 1 แห่ง                               | ขั้นตอนที่ 2       |
|       |   |  | ระดับ M1 = 1 แห่ง                              | -                  |
|       |   |  | ระดับ F2 = 5 แห่ง                              | -                  |
|       |   |  | ระดับ F3 = 2 แห่ง                              | -                  |
| 11.   | ผู้ป่วยยาเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่อง<br>3 เดือน หลังจำหน่ายจากการ<br>บำบัดรักษาตามเกณฑ์กำหนด | ร้อยละ 92  | ผู้ป่วยฯ 103 คน<br>หยุดเสพต่อเนื่องฯ<br>103 คน | ร้อยละ 100         |
| 12.   | เด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์<br>(EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป                                    | ร้อยละ 70  | อยู่ระหว่างการดำเนินงาน (ศูนย์จิตฯ)            |                    |
| 13.   | ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึง<br>บริการสุขภาพจิต                                       | ร้อยละ 50  | เป้าหมาย 8,854<br>ผลงาน 2,610                  | ร้อยละ 21.47       |