

# การดำเนินงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด

# Fast Track



Service

## มาตรการสำคัญ



## Stroke

### Situation

อัตราการรอดเลือดสมอง 8.2%  
อัตราการรอดเลือดสมองแตก 22.4%  
ทุกจังหวัดมี Stroke fast track

### KPI

Door to needle  $\geq 50\%$   
Door to operation room  $\geq 60\%$



## Small Success





# อัตราการตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมองหลังการจำหน่าย

ผลการดำเนินงาน 7 เดือน


## ปัญหา/อุปสรรค

- การเข้าถึง Stroke Fast Track ล่าช้า
- อัตราการได้รับยา rTPA
- การจัดตั้ง Stroke unit / Post Stroke Care / อัตรากำลัง Stroke Nurse
- การลงข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

## แนวทางแก้ไข

- ดำเนินการเชิงรุกด้าน Stroke Awareness : Stroke Atert & Pre – Hospital care (EMS) ได้รับยาละลายลิ่มเลือดได้เร็ว
- จัดทำระบบการดูแล Acute care เข้าถึง Fast Track และการได้รับยา rTPA
- พัฒนาระบบการส่งต่อและการดูแลต่อเนื่อง Intermediate care

เป้าหมาย ≤ ร้อยละ 7



ข้อมูล HDC ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 62



# ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตที่ควบคุมได้

ผลการดำเนินงาน 7 เดือน

เป้าหมาย DM  $\geq 40$  / HT  $\geq 50$


## ปัญหา/อุปสรรค

- ผู้ป่วยไม่สามารถจัดการตนเอง ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้ ส่งผลให้ไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์
- การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการควบคุมระดับน้ำตาลและความดันโลหิตยังไม่ครอบคลุม
- บุคลากร Systeme Manager / Case Manager ไม่เพียงพอ


## แนวทางการพัฒนา

- พัฒนาระบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้เกิดการจัดการตนเอง
- ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วยDM/HT ที่ควบคุมไม่ได้ และการวางแผนลดปัจจัยเสี่ยง
- พัฒนาระบบการติดตามผู้ป่วยให้มารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

### DM



### HT





# ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตที่ควบคุมได้

ผลการดำเนินงาน 7 เดือน

## ปัญหา/อุปสรรค


- คุณภาพบริการของ CKD Clinic การคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM/HT ยังทำได้น้อย
- ขาดบุคลากรสหวิชาชีพใน CKD Clinic แพทย์ พยาบาล นักกำหนดอาหาร นักกายภาพบำบัด ฯลฯ
- Health Literacy of CKD ของประชาชนยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย

## แนวทางการพัฒนา


- พัฒนาศักยภาพของ CKD Clinic และเชื่อมโยงกับงาน NCD
- เพิ่มการคัดกรอง CKD ในผู้ป่วย DM/HT และการใช้ยา NSAID
- ติดตามประเมินการตรวจ creatinine ในการคัดกรอง ควรตรวจ 2 ครั้ง/ปี
- ประสานท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดำเนินการสร้างการรับรู้ถึงความรุนแรงและความเจ็บป่วยของโรค (Health Literacy)

เป้าหมาย ร้อยละ 60

### คัดกรอง



### eGFR ลดลง



# ยาเสพติด

Service

กระทรวงสาธารณสุข  
Ministry of Public Health



## มาตรการสำคัญ



## Small Success

ไตรมาส 1

ไตรมาส 4



บำบัดฟื้นฟู

แนวทางบำบัดฟื้นฟู CBTx

จังหวัดดำเนินการ CBTx **100%**

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3



กำกับมาตรฐาน

จังหวัดมีการกำกับมาตรฐานหน่วยบำบัด **70%**

จังหวัดมีการกำกับมาตรฐานหน่วยบำบัด **100%**

ไตรมาส 2

ไตรมาส 4



พัฒนากฎหมาย

พัฒนากฎหมายลำดับรองด้านบำบัดฟื้นฟู **40%**

พัฒนากฎหมายลำดับรองด้านบำบัดฟื้นฟู **70%**

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

HA

ยาเสพติด



สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู ผ่านมาตรฐาน **75%**

สถานพยาบาล/สถานฟื้นฟู ผ่านมาตรฐาน **80%**

ไตรมาส 4

ผู้บำบัด



Remission rate (ต่อเนื่อง 3 เดือน) **40%**

Retention rate (ต่อเนื่อง 1 ปี) **20%**



**Situation**  
ผู้ป่วยได้รับการบำบัดและหยุด  
เสพต่อเนื่อง  
**Leading indicator 95%**  
**Laging indicator 68%**

**KPI**  
**Retention rate (ต่อเนื่อง 1 ปี) 20%**  
**Remission rate (ต่อเนื่อง 3เดือน) 40%**



# งานยาเสพติด

ตัวชี้วัด : ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระบบ ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention)


: ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่าย 3 เดือน ( Remission)

## สถานการณ์

- เยาวชนอายุ 15 -24 ปี ใช้ยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
- ยาเสพติด มีราคาถูกลง ทำให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงได้ง่ายขึ้น และสภาพแวดล้อมในชุมชนเอื้อให้ใช้ยาเพิ่มขึ้น
- ขาดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดูแลในชุมชน

## แก้ไขปัญห


1. ส่งเสริมสร้างความตระหนักและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจทุกกลุ่มวัย
2. เพิ่มการเข้าถึงการบำบัดฟื้นฟู โดยกระบวนการบำบัดฟื้นฟูโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ( CBTx )
3. พัฒนาคุณภาพการบำบัดตามมาตรฐานและการเข้าถึงบริการ
4. เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ติดตามผู้ผ่านการบำบัด



■ ผ่านการบำบัด

■ ติดตาม 1 ปี

Retention=32.7



■ ผ่านการบำบัด

■ ติดตาม 3 เดือน

Remission=60.5



ตัวชี้วัด : ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระบบ ได้รับการดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention)

: ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพ ที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่าย 3 เดือน ( Remission)

อำเภอ	Retention							Remission						
	ระบบสมัครใจ		ระบบบังคับ		รวมทุกระบบ			ระบบสมัครใจ		ระบบบังคับ		รวมทุกระบบ		
	ผู้ผ่าน	ติดตาม1ปี	ผู้ผ่าน	ติดตาม1ปี	ผู้ผ่าน	ติดตาม1ปี	ร้อยละ	ผู้ผ่าน	ติดตาม3 m	ผู้ผ่าน	ติดตาม3m	ผู้ผ่าน	ติดตาม3m	ร้อยละ
เมือง	25	17	1059	411	1,084	428	39.5	162	122	64	27	226	149	65.9
อัญประเทศ	1	1	1	0	2	1	50	34	17	77	27	111	44	39.6
วัฒนานคร	55	19	93	16	148	35	23.6	122	106	18	4	130	110	84.6
วังน้ำเย็น	2	0	87	9	89	9	10.1	52	30	12	1	64	41	48.4
ตาพระยา			41	2	41	2	4.9	56	27	12	1	68	28	41.1
เขาฉกรรจ์	4	2	43	1	47	3	6.4	11	7	1	0	12	7	58.3
คลองหาด			34	10	34	10	29.4	1	0	2	1	3	1	33.3
โคกสูง	1	0	22	9	23	9	39.1	35	26	0	0	37	26	70.2
วังสมบูรณ์			12	3	12	3	25	15	10	10	3	25	13	52.0
รวม	88	39	1,391	462	1530	500	32.7	478	345	198	64	676	409	60.5



# อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จต่อแสนประชากร


## ปัญหา/อุปสรรค

- ผู้ฆ่าตัวตายสำเร็จไม่ได้รับการคัดกรอง
- ฐานข้อมูลไม่เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน
- การคัดกรองไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มวัย


## แนวทางแก้ไข

- คัดกรอง 2Q ทั้งเชิงรุกและเชิงรับในชุมชน และสถานที่ทำงาน
- แต่ละ CUP วิเคราะห์ปัญหาและดำเนินกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหา

เป้าหมาย : ไม่เกิน 6.3 ต่อแสนประชากร



ข้อมูลจาก แบบรายงาน รง.๕๐๖S รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์



## แนวทางการแก้ไขปัญหาละแต่ละอำเภอ

อำเภอ	กิจกรรม
เมืองสระแก้ว	ให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า ภาวะติดสุรา โรคจิตเภท สังเกตอาการและการช่วยเหลือเบื้องต้น และคัดกรองซึมเศร้าภาวะติดสุรา โรคจิตเภท ในกลุ่มประชากรวัยทำงาน
คลองหาด	คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยม และให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การสังเกตอาการ การช่วยเหลือเบื้องต้น
ตาพระยา	คัดกรองภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้ป่วยเปราะบางอำเภอตาพระยา
วังน้ำเย็น	คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา ยาเสพติด
วัฒนานคร	คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มนักเรียนมัธยม และให้ความรู้เรื่องโรคซึมเศร้า การสังเกตอาการ การช่วยเหลือเบื้องต้น
เขาฉกรรจ์	คัดกรองซึมเศร้าในกลุ่มผู้เข้ารับการรักษา ยาเสพติด
อรัญประเทศ	คัดกรองซึมเศร้า ในกลุ่มวัยทำงาน
โคกสูง	ดูแล และรักษาผู้ป่วยจิตเวชให้ได้รับยาครบตามนัด อย่างต่อเนื่อง
วังสมบูรณ์	ผู้ป่วยจิตเวชรับยาครบต่อเนื่อง