

ระดับความสำเร็จในการพัฒนาสู่การเป็นโรงพยาบาลส่งเสริม การใช้ยาอย่างสมเหตุผล (RDU)

R

D

U

	3 เดือน	6 เดือน	9 เดือน	12 เดือน
RDU ชั้นที่ 1 60%	RDU ชั้นที่ 1 70%	RDU ชั้นที่ 1 80% RDU ชั้นที่ 2 15% มีระบบจัดการ AMR	RDU ชั้นที่ 1 80% RDU ชั้นที่ 2 20% มีระบบจัดการ AMR	
RDU ชั้นที่ 2 5%	RDU ชั้นที่ 2 10%	บูรณาการ 40%	บูรณาการ 70%	

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

RDU ชั้นที่ 2 RDU1 : ยังไม่รพ.ไต่ผ่าน RDU2 : ผ่าน 7 แห่ง

RDU 1 ชั้นที่ 2	ผลการดำเนินงาน									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	คลองหาด	ตาพระยา	เขาฉกรรจ์	โคกสูง	วังสมบูรณ์
1. การใช้ยาปฏิชีวนะใน URI ในรพ.	≤ ร้อยละ 20	38.74	27.53	31.50	18.56	32.26	34.67	29.74	20.40	39.77
2. การใช้ยาปฏิชีวนะใน AD ในรพ.	≤ ร้อยละ 20	22.83	24.77	25.26	12.21	41.06	28.87	20.2	23.5	36.06
3. การใช้ยาปฏิชีวนะในแผลสด ในรพ.	≤ ร้อยละ 40	68.98	69.15	48.72	44.59	70.63	58.87	40.25	52.67	53.43
4. การใช้ยาปฏิชีวนะในหญิงคลอดปกติ	≤ ร้อยละ 10	38.64	12.4	6.01	5.93	9.03	0	6.86	0	0
5. การใช้ NSAIDs ใน CKD> stage 3	≤ ร้อยละ 10	1.07	2.15	0.48	2.67	0.4	1.99	1.47	0.17	6.76
6. การใช้ Gliben ในผู้สูงอายุ/โรคไต	≤ ร้อยละ 5	4	8.61	0	0	0	0	0	0	0
7. การห้ามใช้ยาบางชนิดในหญิงมีครรภ์	0 ราย	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RDU 2 ชั้นที่ 2 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบูรณ์	โคกสูง
ร้อยละของรพ.สต.มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 60 ของรพ.สต. ผ่านเกณฑ์	68.18	56.25	55.56	73.33	71.43	95.24	71.43	66.67	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

RDU ชั้นที่ 3 (ในภาพรวม ต้องมีรพ.ผ่าน 20% ปี 63 และ 80% ปี 64) : ยังไม่รพ.ใดผ่าน

RDU 1 ชั้นที่ 3	ผลการดำเนินงาน ณ Q2/2561									
	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบурณ์	โคกสูง
1. ผู้ป่วยHT ที่ใช้ยา RAS blocaad (ACEI/ARB/ Renin inh) 2 ชนิดร่วมกัน	ร้อยละ 0	0.00	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.53
2. ผู้ป่วย DM ที่ใช้ยา metforminในรพ.	>= ร้อยละ 80	69.25	77.85	79.32	75.38	54.02	60.62	66.75	80.39	71.06
3. ผู้ป่วยที่ใช้ยากลุ่ม NSAIDs ซ้ำซ้อน	<= ร้อยละ 5	0.18	0.30	0.07	0	0.28	0.14	0.10	0.22	0
4. ผู้ป่วยโรคหืดที่ได้ inhal corticosteroid	>= ร้อยละ 80	45.27	38.99	63.33	63.40	56.31	62.44	48.32	47.96	66.13
5. ผู้สูงอายุที่ใช้ยา long-act benzodiazepine	<= ร้อยละ 5	1.99	1.73	3.08	2.91	3.13	0.83	1.65	0.84	0.55
6. เด็กที่ได้รับการวินิจฉัยได้ยา non - sedating anti-histamine	<= ร้อยละ 20	7.19	5.41	0	1.10	0	0.35	4.05	0	0

RDU 2 ชั้นที่ 3 (รพ.สต.)	เป้าหมาย	รพร.	อรัญ	คลองหาด	ตาพระยา	วังน้ำเย็น	วัฒนานคร	เขาฉกรรจ์	วังสมบурณ์	โคกสูง
ร้อยละของรพ.สต.มีการใช้ยาปฏิชีวนะใน URI และ AD น้อยกว่าร้อยละ 20	ร้อยละ 100 ของ รพ.สต. ผ่านเกณฑ์	68.18	56.25	55.56	73.33	71.43	95.24	71.43	66.67	100

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ข้อมูล ภาพรวมเทียบกับเขตอื่น และจังหวัดในเขต 6

เขต	สถานะ	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 0
เขต 1		0	9	77	16
เขต 2		0	0	27	21
เขต 3		0	2	20	32
เขต 4		0	4	62	5
เขต 5		2	4	57	3
เขต 6		2	4	57	10
เขต 7		2	3	59	13
เขต 8		0	2	34	52
เขต 9		4	2	78	5
เขต 10		2	3	35	31
เขต 11		5	12	64	0
เขต 12		4	5	69	0

จังหวัดในเขต 6

จังหวัด	สถานะ	ชั้นที่ 3	ชั้นที่ 2	ชั้นที่ 1	ชั้นที่ 0
จันทบุรี		0.00% (0)	16.67% (2)	41.67% (5)	41.67% (5)
ฉะเชิงเทรา		18.18% (2)	0.00% (0)	81.82% (9)	-0.00% (0)
ชลบุรี		0.00% (0)	16.67% (2)	66.67% (8)	16.67% (2)
ตราด		0.00% (0)	0.00% (0)	71.43% (5)	28.57% (2)
ปราจีนบุรี		0.00% (0)	0.00% (0)	100.00% (7)	0.00% (0)
ระยอง		0.00% (0)	0.00% (0)	88.89% (8)	11.11% (1)
สมุทรปราการ		0.00% (0)	0.00% (0)	100.00% (6)	0.00% (0)
สระแก้ว		0.00% (0)	0.00% (0)	100.00% (9)	0.00% (0)